

Prä-/Probiotikum zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung

Eine gesunde Darmflora ist nachweislich nicht nur für die Darmgesundheit selbst, sondern auch für ein gut funktionierendes Immunsystem verantwortlich. Wird die Darmflora aus ihrem Gleichgewicht gebracht, können sich krankmachende Keime vermehren und Verdauungsstörungen wie Durchfall oder Blähungen hervorrufen. Auch durch eine Antibiose kann die Darmflora negativ beeinflusst werden.

Dia Paste PRO bringt die Darmflora wieder ins Gleichgewicht, schützt die Darmschleimhaut, stabilisiert die Verdauung und kann so das Immunsystem unterstützen.

Wesentliche ernährungsphysiologische

Merkmale:

Futtermittelzusatzstoffe der Funktionsgruppe „Darmflorastabilisatoren“

Zusammensetzung:

Öle und Fette, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fructo-Oligosaccharide 5 %, Hefen, Malz, Johannisbrotmehl 1,5 %

Analytische Bestandteile:

Rohprotein	5,7 %	Rohfaser	0,3 %
Rohöle und -fette	46 %	Rohasche	28,4 %

Zusatzstoffe pro kg:

Darmflorastabilisator:

Enterococcus faecium NICMB 10415
2 x 10¹¹ KBE

Technologische Zusatzstoffe:

Bentonit	300.000 mg
Butylhydroxyanisol	1.940 mg

Fütterungsempfehlung:

Bei Gefahr von, während und nach Verdauungsstörungen. Zur Verabreichung mit dem Futter.

Bei einem Gewicht

bis	5 kg	2 x täglich	1 g
von	>5 - 10 kg	2 x täglich	2 g
von	>10 - 25 kg	2 x täglich	4 g
von	>25 - 40 kg	2 x täglich	6 g
über	40 kg	2 x täglich	8 g

2 g entsprechen einem Pastenstrang von ca. 4 cm bzw. ca. ½ Teelöffel.



Enterococcus faecium ist ein probiotisches Milchsäure produzierendes Bakterium, das als lebender Mikroorganismus zur Stabilisierung der Darmflora beiträgt.

Präbiotische Fructo-Oligosaccharide und **Johannisbrotmehl** dienen als Nährstoffe für das Wachstum der erwünschten Mikroorganismen im Darm und tragen so zur Aufrechterhaltung einer gesunden Darmflora bei.

Bentonit ist ein Tonmineral mit starker Quellfähigkeit und hohem Wasserbindungsvermögen.

Empfohlene Fütterungsdauer:

Bis zu 4 Wochen. Eine Verlängerung der Fütterungsdauer ist unbedenklich. Es wird empfohlen, vor der Verfütterung oder Verlängerung der Verfütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Die Gabe kann wiederholt werden.

Wegen des erhöhten Gehaltes an Zusatzstoffen nur bis zu 6,7 % der Tagesration verfüttern. Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden.

Bei Raumtemperatur lagern.

Haltbarkeit: 24 Monate

Handelsform: 70 g Tube